
Priktest

Hvad er en priktest

En priktest bliver udført for at undersøge, om du er allergisk overfor stoffer som eksempelvis pollen, husdyr eller madvarer.

Ved priktesten lægger vi en dråbe med stoffet på din underarm. Derefter prikker vi med en lille metalspids (lancet) gennem dråberne, så noget af stoffet kommer ind i det øverste lag af huden. Du vil kunne mærke prikket, men de fleste synes ikke, det gør ondt.

Hvis du er allergisk overfor stoffet, vil det vise sig i form af en lille hævelse i huden med kløe og rødme. Reaktionen kommer i løbet af ca. 15 minutter og minder om et myggestik, men det fortager sig normalt i løbet af en times tid.

Forberedelse:

- » De sidste 3 dage inden testen må du ikke tage anti-histamin (kløestillende medicin).
- » Det sidste døgn inden testen må du ikke smøre med cremer eller salver, der indeholder binyre-barkhormon på det område på underarmen, hvor testen skal foretages.
- » Den dag priktesten skal udføres, må du ikke smøre underarmene med fugtighedscreme.
- » Hvis du er gravid eller ammer, bedes du oplyse lægen herom.
- » Hvis du har aftalt med lægen, at du selv skal medbringe et stof (fx madvarer) der skal undersøges for, skal du huske at medbringe det, den dag hvor testen skal foretages.

Hvis man finder allergi - hvad så?

Hvis der ved undersøgelsen påvises allergi overfor et eller flere stoffer, vurderes du igen af lægen.