
Tangentiel fjernelse af godartede modermærker

Beskrivelse af proceduren

Forud for indgrebet anlægges lokalbedøvelse. Det føles som et prik og en sviende fornemmelse.

Ved selve operationen skæres modermærket væk parallelt med hudens overflade uden, at der skal syes. Det efterlades et sår, der heler og bliver til et ar

Efter operationen

Efter operationen påsættes plaster. Plasteret kan fjernes om aftenen eller næste dag og generelt har såret bedst af luft uden at være pakket ind. Det er normalt, at såret kan væske lidt de første dage efter operationen.

Operationen vil efterlade et ar. Så længe arret er rødt (op til et år efter operationen), bør det ikke få sol.

Der er ikke behov for særlige hensyn efter operationen, bortset fra at man selvfølgelig skal undgå at få snavs i såret.

Når et modermærke fjernes parallelt med hudens overflade, fjernes det ikke altid helt i dybden. Modermærket kan derfor i enkelte tilfælde komme frem igen. Hvis det sker, er det som grundregel ikke farligt, men kan fjernes, hvis det ønskes.

Smerter og infektionstegn

Der kan være lette smerter de første dage efter indgrebet, og der må tages Paracetamol tabletter op til 1 gram 4 gange i døgnet.

Hvis der pludseligt kommer kraftigere smerter, varme, rødme og hævelse kan det være tegn på infektion, og du bør kontakte klinikken eller anden læge.

Kontrol

En eventuel kontrol af det opererede område aftales med lægen. Det er ikke fast kutyme at kontrollere efter fjernelse af godartede modermærker

Svar på prøven

Der bliver altid indsendt væv til mikroskopisk undersøgelse. Svaret herpå haves typisk efter 2-3 uger. Du kan få svar pr. telefon på 98 12 54 55 - tast 2 - eller pr. mail efter registrering via vores hjemmeside www.hcnord.dk . Vær opmærksom på, at registreringen slutter med at, man skal sende en besked om, at man er på systemet.